



Bestanddelen

Propyleenglycol, ureum, glycerol, melkzuur, water, natriumhydroxide, dinatrium EDTA.

Inhoud

Naloc, 10 ml.

Uiterlijk

Naloc is een heldere, kleurloze vloeistof in een plastic buis met een siliconen druppelaar om het aanbrengen op de nagel te vergemakkelijken. Naloc bevat geen conserveermiddelen en parfum. De bestanddelen zijn volledig biologisch afbreekbaar.

Indicatie

Voor de behandeling van nagels die zijn aangetast door een schimmelinfectie (onychomycose) of door psoriasis. Naloc verbetert het uiterlijk van verkleurde en misvormde nagels. Naloc heeft een fysisch keratolytisch (ontschilferend) effect en zorgt voor afbraak van de cellen van de schimmels die een schimmelnagel kunnen veroorzaken. Naloc verbetert de hydratatie van de nagel en maakt de buitenste laag van de nagelplaat glad en, door het veranderen van de micro-omgeving van de nagel en het verbeteren van het nageloppervlak, blijft de nagel in een goede conditie. De eerste zichtbare verbeteringen worden doorgaans na één of twee weken waargenomen. In een klinisch onderzoek zag 76% van de gebruikers een verbetering van het uiterlijk van de nagel al na 1 week, 92% zag dit na 8 weken.

Gebruik

Breng Naloc eenmaal daags op de aangedane nagel aan, bij voorkeur 's avonds vlak voor het slapengaan. Houd de punt van de tube tegen de nagel. Knijp zacht in de tube en verspreid de oplossing met de punt. Bedek de nagel met een dunne laag van de oplossing. Het is belangrijk dat de oplossing ook onder de vrije rand van de aangedane nagel wordt aangebracht. Laat de nagel na het aanbrengen enkele minuten drogen. De behandelduur varieert afhankelijk van de ernst van de infectie, in veel gevallen kan 3-6 maanden behandeling noodzakelijk zijn. Zet voor optimale resultaten de behandeling voort tot een nieuwe gezonde nagel is uitgegroeid. Breng Naloc niet aan op het nagelbed indien de nagel of delen van de aangetaste nagel verwijderd zijn van het onderliggende nagelbed. Gebruik tijdens de behandeling bij voorkeur geen nagellak omdat Naloc hierdoor minder goed werkt.

Naloc werkt alleen lokaal en kan daarom tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding worden gebruikt. De ervaring bij kinderen is beperkt. Raadpleeg daarom voor behandeling bij kinderen uw arts.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met ogen of slijmvliezen. Gebruik Naloc niet als u allergisch bent voor één van de ingrediënten.

Mogelijke bijwerkingen

Bij sommige patiënten kan tijdelijke lichte irritatie van de huid direct naast de nagel en verkleuring van de nagel optreden. Daarbij kan ook de nagel, waaronder het aangedane deel van de nagel, loslaten van het onderliggende nagelbed (onycholyse).

Houdbaarheid en bewaren

Te gebruiken tot: zie datum vermeld op de tube en de verpakking. Bewaren tussen 2°C en 25° C. Beschermen tegen zonlicht en bevroering. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant

Moberg Pharma AB, Gustavslundsv.
42, SE-167 51 Bromma, Sweden

Distributeur

Meda Pharma B.V., een Mylan organisatie
Krijgsmann 20
1186 DM Amstelveen, Nederland

www.naloc.nl



Meda Pharma S.p.A.

astuccio f. illustr. etichetta _____ NALOC FOGLIO ILLUSTRATIVO OLANDA



font size minima

7 pt

aperto

150X228

chiuso

profilo

cod. prodotto

8655

Rif. Colore/Pantone

■ Black

bozza

Approvato

No. 3 del 13/07/2017

il:

da:

I colori di questa prova grafica sono puramente indicativi. *The colours are indicative.*